

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB

Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia em Saúde - SAFTEC

Diretoria de Assistência Farmacêutica - DASF

Coordenação de Assistência Farmacêutica na Atenção Especializada - COAFE

FORMULÁRIO DE ACESSO - SÍNDROME NEFRÓTICA PRIMÁRIA EM ADULTOS**PORTARIA CONJUNTA Nº 8, DE 14 DE ABRIL DE 2020**

Nome do Paciente: _____	Data do Atendimento: ____ / ____ / ____
Médico Responsável: _____	CRM: _____ UF: ____

1. Diagnóstico:

() Tratamento inicial () Recidivas esporádicas () Corticodependente ou de recidivas frequentes

2. Selecionar, dentre os critérios listados, aqueles que o paciente apresenta:

() Síndrome nefrótica definida pela presença de proteinúria ($>3,0-3,5$ g/1,73m²/dia em adultos), hipoalbuminemia ($<3,0$ g/dl) e edema, frequentemente de hiperlipidemia, hipercoagulabilidade e outras alterações clínico-laboratoriais **(anexar hemograma)**

() Diagnóstico histopatológico de material obtido por biopsia renal referentes aos diagnósticos especificados no PCDT **(anexar biopsia renal)**

() Presença de proteinúria nefrótica ($>3,0-3,5$ g/1,73m² de superfície corporal/dia), mesmo sem o quadro completo de síndrome nefrótica, sem diagnóstico histopatológico **(anexar hemograma)**

() Pacientes com síndrome nefrótica primária nos quais a contraindicação para realização de biopsia renal seja absoluta **(anexar relatório médico com justificativa)**

3. Selecionar, dentre os itens listados, aqueles que o paciente apresenta:

() Neoplasia maligna em atividade (de pulmão, pele – exceto carcinoma de células escamosas, mama e cólon, entre outras)

() Creatinina sérica superior a 3,5mg/dl, com doença renal crônica estágio 4 (taxa de filtração glomerular entre 15 e 29 ml/min /1,73 m² SC) ou estágio 5 (taxa de filtração glomerular <15 ml/min /1,73 m² SC), com ou sem evidência de rins diminuídos ou contraídos (<9 cm)

() Contraindicações específicas para uso de ciclofosfamida: contagem de leucócitos $<3.000/\text{mm}^3$, contagem de neutrófilos $<1.500/\text{mm}^3$ e contagem de plaquetas $<50.000/\text{mm}^3$

() Condições ou doenças sistêmicas subjacentes, como diabetes melito, hepatites virais, soro positividade para HIV, sífilis e colagenoses como lúpus eritematoso sistêmico, crioglobulinemia e vasculites sistêmicas anti-citoplasma de neutrófilos (ANCA) positivas (poliangeíte com granulomatose, poliangeíte microscópica)

Assinatura e carimbo do médico