



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB

Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia em Saúde - SAFTEC

Diretoria de Assistência Farmacêutica – DASF

Coordenação de Assistência Farmacêutica na Atenção Especializada - COAFE

Guia de Orientação ao Paciente

Penicilamina

MEDICAMENTO UTILIZADO NO TRATAMENTO DE DOENÇA DE WILSON.

1. SOBRE O MEDICAMENTO

- Guarde os comprimidos ou cápsulas de penicilamina protegidos do calor, ou seja, evite lugares onde exista variação de temperatura (cozinha e banheiro)
- Conserve os medicamentos na embalagem original, bem fechados.
- Mantenha fora do alcance das crianças.

2. NA HORA DE TOMAR OS MEDICAMENTOS

- Os medicamentos devem ser tomados de estômago vazio, 1h antes ou 2h após as refeições.
- Em caso de esquecimento de uma dose, aguarde para tomar a próxima no horário usual. **Não tome a dose dobrada.**
- Os medicamentos em forma de cápsula devem ser tomados inteiros, sem serem abertos, partidos ou mastigados.

3. REAÇÕES DESAGRADÁVEIS

Apesar dos benefícios que estes medicamentos trazem, é possível que ocorram algumas reações desagradáveis.

Penicilamina: podem aparecer dores abdominais, dores de cabeça, reações alérgicas na pele, náuseas, vômitos, diarreia, falta de ar, cansaço, fraqueza entre outros.

- Se sentir algum destes sintomas, não interrompa o tratamento; comunique-se com seu médico imediatamente.
- Se outros sintomas aparecerem, comunique-se com seu médico.
- Maiores informações sobre efeitos adversos constam no Termo de Consentimento, documento assinado por você e seu médico.

4. USO DE OUTROS MEDICAMENTOS

- Não faça uso de outros medicamentos sem o conhecimento do seu médico ou orientação de um profissional de saúde. Pode ser perigosa a sua saúde.

5. REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE LABORATÓRIO

- A realização dos exames garante uma correta avaliação sobre o efeito que o medicamento está fazendo no seu organismo. Em alguns casos pode ser necessário ajustar a dose ou modificar o tratamento.

6. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Procure não comer alimentos que contenham quantidades mais elevadas de cobre, como frutos do mar, chocolate, amêndoas, café, feijão, fígado e derivados da soja.
- **Penicilamina:** pode causar problemas graves no feto, podendo nascer um bebê com defeitos físicos e mentais. Por isso, em caso de gravidez durante o tratamento com este medicamento, comunique ao médico imediatamente.

7. PARA SEGUIR RECEBENDO O MEDICAMENTO

- Retorne à farmácia em um mês, com os seguintes documentos:
 - receita médica;
 - documento de identidade;
 - exames necessários para as dispensações:
 - dosagem de cobre urinário de 24h, dosagem de cobre sérico livre;
 - para penicilamina também são necessários: QUE, hemograma, plaquetas ALT, AST.
- O farmacêutico irá lhe indicar a periodicidade dos exames laboratoriais para serem encaminhados a cada dispensação.

8. EM CASO DE DÚVIDAS

- Se você tiver qualquer dúvida que não esteja esclarecida neste guia, antes de tomar qualquer atitude, procure orientação com seu médico ou farmacêutico do SUS.

9. OUTRAS INFORMAÇÕES

SE, POR ALGUM MOTIVO, NÃO USAR O MEDICAMENTO,
DEVOLVA-O À FARMÁCIA