

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB

Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia em Saúde - SAFTEC

Diretoria de Assistência Farmacêutica - DASF

Coordenação de Assistência Farmacêutica na Atenção Especializada - COAFE

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE COLÍRIOS - GLAUCOMA**PORTARIA CONJUNTA SAES/SECTICS Nº 28, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023**

Atenção: Este formulário visa OTIMIZAR o acesso aos medicamentos de Glaucoma, de acordo com o PCDT de Glaucoma do Ministério da Saúde.

Nome do Paciente:		
Médico Responsável:	CRM:	UF:
CID-10:	Data do preenchimento:	/ /

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO**Indicar os dados apresentados nos exames do(a) paciente:****RETINOGRAFIA** (Igual ou acima de 0,5mm): OD: _____ mm; OE: _____ mm**PRESSÃO INTRA OCULAR (PIO- acima de 21mmHg):** OD: _____ mmHg; OE _____ mm***Poderão ser solicitados outros exames para a avaliação do glaucoma.****CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE ESQUEMA TERAPÊUTICO**

1) Monoterapia com Timolol: deverá preencher 2 ou mais dos critérios gravidade menores OU 1 critério gravidade menor e 1 critério gravidade maior.

Critérios gravidade menores:☐ PIO de 21-26 mmHg na ausência de medicamento antiglaucomatoso;☐ Alargamento da escavação (relação entre o diâmetro da escavação e o diâmetro do disco) do disco óptico entre 0,5-0,8;☐ Alteração no campo visual compatível com glaucoma sem comprometimento dos 10 graus centrais em nenhum dos olhos;**Critérios gravidade maiores:**☐ PIO acima de 26 mmHg na ausência de medicamento antiglaucomatoso;☐ Cegueira por dano glaucomatoso em um olho;☐ Alargamento da escavação (relação entre o diâmetro da escavação e o diâmetro do disco) do disco óptico acima de 0,8;☐ Comprometimento em 3 ou mais quadrantes ou dano nos 10 graus centrais em um dos olhos;☐ Progressão documentada do dano glaucomatoso em campimetria visual ou retinografia colorida a despeito do tratamento hipotensor.**2) Monoterapia com dorzolamida, brinzolamida ou brimonidina (segunda linha):**☐ Falha primária ou contraindicação ou reação adversa ao timolol.

3) Monoterapia com prostaglandinas (latanoprost, bimatoprost ou travoprost): deverá preencher 2 ou mais critérios de gravidade maiores OU 1 gravidade maior e pelo menos 2 gravidade menores. Além disto deverá apresentar falha primária ou terapêutica.

Critérios gravidade maiores:☐ PIO acima de 26 mmHg na ausência de medicamento antiglaucomatoso;☐ Cegueira por dano glaucomatoso em um olho;☐ Alargamento da escavação (relação entre o diâmetro da escavação e o diâmetro do disco) do disco óptico acima de 0,8;☐ Comprometimento em 3 ou mais quadrantes ou dano nos 10 graus centrais em um dos olhos;☐ Progressão documentada do dano glaucomatoso em campimetria visual ou retinografia colorida a despeito do tratamento hipotensor.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB

Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia em Saúde - SAFTEC

Diretoria de Assistência Farmacêutica – DASF

Coordenação de Assistência Farmacêutica na Atenção Especializada - COAFE

Critérios gravidade menores:

- () PIO de 21-26 mmHg na ausência de medicamento antiglaucomatoso;
- () Alargamento da escavação (relação entre o diâmetro da escavação e o diâmetro do disco) do disco óptico entre 0,5-0,8;
- () Alteração no campo visual compatível com glaucoma sem comprometimento dos 10 graus centrais em nenhum dos olhos;

Falha terapêutica para monoterapia com prostaglandinas:

- () Falha primária ou terapêutica da associação de timolol e um medicamento de segunda linha (ou dorzolamida ou brinzolamida ou brimonidina).
- () Falha primária ou terapêutica de medicamento de segunda linha (ou dorzolamida ou brinzolamida ou brimonidina).

4) Associação de timolol e medicamento de segunda linha (dorzolamida, brinzolamida ou brimonidina):

- () Falha terapêutica com timolol
- () Contraindicação ou falha primária ao uso de prostaglandina

5) Associação de timolol e e prostaglandina (latanoprosta, bimatoprosta ou travoprosta):

- () Contraindicação ou falha primária ao uso de prostaglandina

6) Associação de medicamento de segunda linha (dorzolamida, brinzolamida ou brimonidina) e prostaglandina (latanoprosta, bimatoprosta ou travoprosta):

- () Falha terapêutica com monoterapia medicamentosa de segunda linha.

Assinatura e carimbo do médico