GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB
Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia em Saúde - SAFTEC
Diretoria de Assistência Farmacêutica – DASF
Coordenação de Assistência Farmacêutica na Atenção Especializada - COAFE

FORMULÁRIO DE ACESSO - SÍNDROME NEFRÓTICA PRIMÁRIA EM ADULTOS

PORTARIA CONJUNTA Nº 8, DE 14 DE, ABRIL DE 2020

Nome do Paciente		
Médico Responsável:	**CRM:**	**UF:**
CID-10:	**Data do preenchimento:**	**/ /**

1. Diagnóstico:
( ) Tratamento inicial ( ) Recidivas esporádicas ( ) Corticodependente ou de recidivas frequentes

2. Selecionar, dentre os critérios listados, aquele(s) que o paciente apresenta:
( ) Síndrome nefrótica definida pela presença de proteinúria (>3,0-3,5 g/1,73m2/dia em adultos), hipoalbuminemia (<3,0 g/dl) e edema, frequentemente de hiperlipidemia, hipercoagulabilidade e outras alterações clÍnico-laboratoriais **(anexar hemograma).**

( ) Diagnóstico histopatológico de material obtido por biopsia renal referentes aos diagnósticos especificados no PCDT **(anexar biopsia renal).**

( ) Presença de proteinúria nefrótica (>3,0-3,5 g/1,73m2 de superfície corporal/dia), mesmo sem o quadro completo de síndrome nefrótica, sem diagnóstico histopatológico **(anexar hemograma).**

( ) Pacientes com síndrome nefrótica primária nos quais a contraindicação para realização de biopsia renal seja absoluta**.**
Justificativa da contraindicação: _____

_____

_____

_____

3. Selecionar, dentre os itens listados, aquele(s) que o paciente apresenta:
( ) Neoplasia maligna em atividade (de pulmão, pele – exceto carcinoma de células escamosas, mama e cólon, entre outras).

( ) Creatinina sérica superior a 3,5mg/dl, com doença renal crônica estágio 4 (taxa de filtração glomerular entre 15 e 29 ml/min /1,73 m2 SC) ou estágio 5 (taxa de filtração glomerular < 15 ml/min /1,73 m2 SC), com ou sem evidência de rins diminuídos ou contraídos (< 9 cm).

( ) Contraindicações específicas para uso de ciclofosfamida: contagem de leucócitos <3.000/mm3, contagem de neutrófilos <1.500/mm3 e contagem de plaquetas <50.000/mm3.

( ) Condições ou doenças sistêmicas subjacentes, como diabete melito, hepatites virais, soro positividade para HIV, sífilis e colagenoses como lúpus eritematoso sistêmico, crioglobulinemia e vasculites sistêmicas anti-citoplasma de neutrófilos (ANCA) positivas (poliangeíte com granulomatose, poliangeíte microscópica).

( ) Nenhuma das condições listadas acima.

_____
Assinatura e carimbo do médico