



PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO DO TRATO GENITAL POR CHLAMYDIA TRACHOMATIS EM PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO ESTADUAL ESPECIALIZADO EM DIAGNÓSTICO, ASSISTÊNCIA E PESQUISA (CEDAP) - SALVADOR-BAHIA-BRASIL

ANA GABRIELA ALVARES TRAVASSOS (CEDAP); LUCIANA DE CARVALHO AZEVEDO (ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA); MÁRCIO PIRES DOS SANTOS (CEDAP); MARIA ANGELA SOIDAN (CEDAP); ROBERTO DIAS FONTES (CEDAP)

OBJETIVO


Avaliar a prevalência de infecção do trato genital por *Chlamydia trachomatis* em pacientes atendidos em ambulatório, e comparar a prevalência desta infecção entre pacientes com diagnóstico de HIV com o grupo que não possui esse diagnóstico.

MATERIAL E MÉTODOS


Foi realizado estudo retrospectivo de revisão de registro do laboratório do CEDAP, de todos os pacientes que foram submetidos à pesquisa de *Chlamydia trachomatis* através da técnica de captura híbrida II, no período de 30 de junho de 2010 a 31 de janeiro de 2011. As informações coletadas foram registradas em ficha clínica confidencial, totalizando 399 pacientes. Os dados foram armazenados e analisados em banco de dados criado no programa SPSS, versão 15.0.

RESULTADOS

Diagnóstico de HIV entre as pacientes submetidas à pesquisa para *Chlamydia trachomatis* no CEDAP, Salvador-Bahia (2010-2011)



Resultado de Pesquisa para *Chlamydia trachomatis* nas pacientes atendidas no CEDAP, Salvador-Bahia (2010-2011)



Relação entre resultados de pesquisa para *Chlamydia trachomatis* e diagnóstico de HIV nas mulheres atendidas no CEDAP, Salvador-Bahia (2010-2011).

Resultado de pesquisa	Diagnóstico de HIV		TOTAL	p-valor 0,417
	Não	Sim		
Negativo	302 (86,3%)	44 (89,8%)	346	
Positivo	34 (9,7%)	3 (6,1%)	37	
Indeterminado	14 (4%)	2 (4,1%)	16	
TOTAL	350 (100%)	49 (100%)	399	

CONCLUSÃO

Não existem indícios que comprovem relação do diagnóstico de HIV com a prevalência de *Chlamydia trachomatis* na população estudada. Considerando o resultado indeterminado como presumidamente positivo, poderíamos encontrar um aumento na prevalência em relação à população geral descrito na literatura. O estudo sugere investigação com uma população maior e por um período mais prolongado, comparando métodos diagnósticos e dados epidemiológicos.

BIBLIOGRAFIA

- 1 - SIMÕES, J.A.; Giraldo, P.C.; Faundes, A. Prevalence of Cervicovaginal Infections During Gestation and Accuracy of Clinical Diagnosis. Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology. 6:129-133 (1998)
- 2 - JALIL, E.M.; Pinto, V.M.; Benzaken, A.S.; et al. Prevalence of *Chlamydia* and *Neisseria gonorrhoeae* infections in pregnant women in six Brazilian cities. Rev Bras Ginecol Obstet, 2008; 30(12):614-9
- 3 - BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DST - AIDS. Brasília 2010. Disponível em: http://www.saude.rio.rj.gov.br/media/dst/aida_vigilancia_ms_boletim_2007.pdf. Acesso em 10 fev, 2011, 20:46:21.

e-mail para contato: agtravassos@yahoo.com.br