

Informe Epidemiológico das Arboviroses Urbanas, Semana Epidemiológica 45, Bahia, 2019

Quadro 1. Casos notificados, coeficiente de incidência e óbitos confirmados por arboviroses urbanas, Bahia, 2019.


SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS (SE)	ATUALIZAÇÃO		
SE de 1 a 45	19/11/2019		
	DENGUE	CHIKUNGUNYA	ZIKA
Casos notificados	65.952	8.946	2.914
Coeficiente de incidência	443,4	60,1	19,6
Óbitos confirmados	31	8	0

Fonte: SINAN/DIVEP/SESAB; (dados até a SE 45, atualizados em 19/11/2019).

DENGUE

No Estado da Bahia, até a Semana Epidemiológica (SE) 45, foram notificados 65.952 casos prováveis de dengue (excluído os descartados), com coeficiente de incidência (CI) de 443,4 casos/100.000 habitantes (**Quadro 1**). Quando comparado ao mesmo período de 2018, verifica-se incremento de 650,6%. A partir da análise do Diagrama de Controle (figura 1), verifica-se cenário de epidemia de Dengue no período entre SE 19 e SE 44.

Figura 1. Diagrama de Controle da dengue, Bahia, 2019.




Fonte: SINAN/DIVEP/SESAB; (dados até a SE 45 atualizados em 19/11/2019).

No período analisado, as Regionais de Saúde com maiores notificações de casos de dengue foram: Feira de Santana (19.204 casos); Salvador (11.125 casos); e Barreiras (4.157 casos), representando 52,2% das notificações do estado da Bahia.

Quando os dados foram analisados por município, verificou-se que Feira de Santana registrou 12.354 casos (18,7%) e Salvador registrou 7.898 casos (11,9%). Os municípios com maiores CI foram Serrolândia (4.232,3 casos/100.00 hab.), Coração de Maria (3.795,6 casos/100.000 hab.) e Terra Nova (3.744,3 casos/100.000 hab.).

A figura 2 apresenta a distribuição dos CI de Dengue no estado da Bahia.

Figura 2: Coeficiente de incidência de dengue, Bahia, 2019.



Fonte: SINAN/DIVEP/SESAB; (dados até a SE 45, atualizados em 19/11/2019).

CASOS GRAVES E ÓBITOS

Em 2019, até a SE 45, foram notificados 91 casos de dengue grave e 1.871 casos com sinais de alarme. Em relação aos óbitos por dengue, até o momento, foram notificados 80 casos. Destes, 31 óbitos foram confirmados (29 óbitos por critério laboratorial, 01 óbito por critério clínico-laboratorial e 01 óbito por critério clínico-epidemiológico) e 18 óbitos estão em investigação. A taxa de letalidade por Dengue dos casos notificados com sinais de alarme e grave na Bahia é de 1,5%.

SOROTIPOS VIRAIS


Na Bahia, até a SE 45, foram identificados os sorotipos circulantes DENV1 e DENV 2.

CHIKUNGUNYA

Até a SE 45, foram notificados 8.946 casos prováveis de Chikungunya no estado da Bahia, com CI de 60,1 casos/100.000 hab. Quando comparado ao mesmo período 2018, verifica-se incremento de 108,5%. A Regional de Saúde de Salvador apresentou o maior número de casos notificados de Chikungunya (6.483), representando 72,4% dos casos registrados no período. Os municípios com maiores números de casos notificados foram: Salvador (2.793 casos/31,2%) e Candeias (1.882 casos/ 21%). Os maiores CI foram registrados em: Candeias (2.161,3 casos/100.000 hab.), Madre de Deus (1.811 casos/100.000 hab.) e São Francisco do Conde (854,2 casos/100.000 hab.). A figura 3 apresenta a distribuição dos CI de Chikungunya no estado da Bahia.

Informe Epidemiológico das Arboviroses, Semana Epidemiológica 45, Bahia,

Figura 3: Coeficiente de incidência de CHIKV, Bahia, 2019.



Fonte: SINAN/DIVEP/SESAB; (dados até a SE 45 atualizados em 19/11/2019).

ÓBITOS


No período analisado, foram confirmados 8 óbitos por Chikungunya na Bahia (7 por critério laboratorial e 01 por clínico-epidemiológico), sendo 3 óbitos no município de Madre de Deus, 2 óbitos em Feira de Santana, 2 óbitos em Candeias e 1 óbito em Salvador. Permanece em investigação 01 óbito no município de Salvador.

ZIKA

Em 2019, até SE 45, foram notificados 2.914 casos suspeitos de Zika, com CI de 19,6 casos/100.000 hab. Quando comparado ao mesmo período 2018, verifica-se incremento de 108,8%. As Regionais de Saúde de Salvador (1.019 casos), Alagoinhas (507 casos) e Feira de Santana (297 casos) registraram os maiores números de casos notificados, concentrando 62,5% das notificações no estado da Bahia. Salvador foi o município que mais notificou casos do agravo neste período (701 casos), representando 24,0% das notificações.

Os maiores CI foram registrados em Paramirim (643,3 casos/100.000 hab.), Esplanada (561,3 casos/100.000 hab.) e Rio Real (542,6 casos/100.000 hab.). A figura 4 apresenta a distribuição dos CI de Zika no estado da Bahia.

Figura 4: Coeficiente de incidência de Zika, Bahia, 2019.



Fonte: SINAN/DIVEP/SESAB; (dados até a SE 45 atualizados em 19/11/2019).

ZIKA EM GESTANTES

Dentre os casos notificados de Zika, 64% foram em indivíduos do sexo feminino. No período analisado, foram registrados 654 casos de Zika em gestantes. Salvador, Esplanada e Camaçari foram os municípios com maiores notificações: 212 casos, 53 casos e 45 casos, respectivamente.


ÓBITOS

No período analisado, não houve registro de óbito por Zika na Bahia.

CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS ARBOVIROSES NO ESTADO DA BAHIA

A figura 5 apresenta áreas de risco para as arboviroses urbanas, a partir de valores acumulados de incidência de Dengue, Zika e Chikungunya.

Figura 5. Coeficiente de incidência de Dengue, Chikungunya e Zika por Regionais de saúde da Bahia, 2019.



Fonte: SINAN/DIVEP/SESAB; (dados até a SE 45 atualizados em 19/11/2019).

EXPEDIENTE

Diretoria de Vigilância Epidemiológica
Jeane Magnavita da Fonseca Cerqueira

Coordenação de Doenças de Transmissão Vetorial
CODTV
Gabriel Muricy Cunha

Equipe Técnica GT Arboviroses
Antônio Carlos Bandeira, Jailton Batista, Ênio Soares, Maiane Ferreira, Wellington Sacramento, Anna Ariane Varjão, Marcelo Medrado, Leonardo Ribeiro (residente), Gabriella Gomes (residente) e Isabela Moura (residente)

(71) 3116.0047 / 3116.0029
divep.arboviroses@saude.ba.gov.br